


**参議院自由民主党
不安に寄り添う政治のあり方勉強会**

「独居高齢者・孤独死」


**独居高齢者の孤独・孤立の予防に向けた
地域社会のあり方について**

令和 2年 4月 3日


**横浜市立大学大学院医学研究科・医学部
地域看護学分野 教授 田高悦子**




1




2




3



4



5



6


Table 1. Consequences of the Cases According to Type of Informant

Informant	n (%)		
	Victimized	Rescued	Misreported
Family member	7 (87.5)	0 (0.0)	1 (12.5)
Neighbor or friend	15 (48.4)	12 (38.7)	4 (12.9)
Official	13 (50.0)	4 (15.4)	9 (34.6)

“Better is a neighbor that is near than a brother far off” is truer than “Blood is thicker than water.”

Fukukawa Y: SOLITARY DEATH: A new problem of an aging society in Japan, JAQS 2011; 58:1.

7



8

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究A (研究代表者: 田高悦子)

独居高齢者の社会的孤立・孤独予防に資する
地域社会に向けて

—地域見守り自己効力感(Mimamori)—

独居高齢者等の社会的孤立・孤独を予防する地域社会
(コミュニティ)に向けた一人ひとりの信念や行動

コミュニティネットワーク

近隣の支え合い

⇒資料②, 資料③

Tadaka E, Kono A, Ito E, Kanaya Y, Dai Y, Imamatsu Y and Itoi W.: Development of a community's self-efficacy scale for preventing social isolation among community-dwelling older people (Mimamori Scale). BMC Public Health. DOI:10.1186/s12889-016-3857-4.